

# Anyhiler C

**IVERMECTINA 1% / CLORSULON 10%  
SOLUCION INYECTABLE**



**PHARMAVET**  
DEL PERU S.A.C.

## **NOMBRE COMERCIAL:**

ANYHILER C

## **COMPOSICIÓN:**

Ivermectina	10 mg
Clorsulón	100 mg
Excipientes c.s.p	1 mL

## **INDICACIONES:**

ANYHILER C, es usado en el tratamiento de **lombrices intestinales** (adultos y larvas de cuarto estadio), **gusanos pulmonares** (adultos y larvas de cuarto estadio), **trematodo hepático** (*Fasciola hepática* y *F. gigantica*; estadios adultos), **gusanos, piojos y sarna**, en ganado de carne y ganado lechero no lactante. Además, **Ectoparásitos**: estados larvarios de dípteros causantes de *miasis*, ácaros productores de *sarna psoróptica* y *sarcóptica*.

## **DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:**

Vía subcutánea.

Administrar 1mL/ 50 kg de p.v.

## **CONTRAINDICACIONES:**

No administrar en animales productores de leche, ni durante los 28 días anteriores al parto.

## **PRECAUCIONES:**

No administrar por vía endovenosa o intramuscular.

No administrar a animales en mal estado general, ni en situaciones de estrés intenso.

No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.

No administrar a animales lactantes.

# Anyhiler C

**IVERMECTINA 1% / CLORSULON 10%  
SOLUCION INYECTABLE**



**PHARMAVET**  
DEL PERÚ S.A.C.

No permita que el agua de los corrales de engorde ingrese a lagos, arroyos o estanques.

No contamine el agua por aplicación directa o la eliminación inadecuada de envases de medicamentos.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Puede aparecer una ligera tumefacción en el sitio de inoculación, lo cual desaparece a los pocos días.

Divida las dosis superiores a 10 ml entre dos lugares de inyección para reducir las molestias ocasionales o las reacciones en el lugar.

Este producto ha sido desarrollado específicamente para su uso exclusivo en ganado.

Este producto no debe utilizarse en otras especies de animales, ya que pueden producirse reacciones adversas graves, incluidas muertes en perros.

Deseche los contenedores en un relleno sanitario aprobado o por incineración.

## **PERIODO DE RETIRO:**

Carne: 35 días.

## **ALMACENAMIENTO:**

Conservar el producto en un ambiente fresco y seco, entre 15° c y 30° c, protegido de la luz solar.

## **PRESENTACIÓN:**

Frasco x 20 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml

## **FABRICADO POR:**

HNC Pharmaceutical Co. Ltd. para Pharmavet del Perú SAC