

## NOMBRE COMERCIAL:

DAIRY SEC CON NEOMICINA

## COMPOSICIÓN:

Penicilina Benzatínica	500.000 UI
Neomicina sulfato	350 mg
Vehículo oleoso c.s.p	8 ml

## INDICACIONES:

Antibiótico intramamario para la prevención y tratamiento de las infecciones de la glándula mamaria durante el periodo de secado sensibles a la penicilina y/o neomicina.

## DOSIFICACION Y ADMINISTRACION:

Un inyector intramamario luego del ultimo ordeño de la lactancia.

Ordeñaren forma exhaustiva el cuarto afectado.

Desinfectar la punta del pezón con una torunda de algodón embebida en alcohol común.

Quitar el tapón plástico de la jeringa cuidando de no tocar la cánula intramamaria con los dedos.

Hacer salir una gota del producto para lubricar el conducto del pezón.

Introducir la cánula intramamaria en el conducto del pezón lo mínimo imprescindible para aplicar el producto.

Inyectar íntegramente el contenido de la jeringa.

Masajear el pezón y porción inferior de la ubre en forma ascendente.

Sumergir el pezón en un baño antiséptico adecuado (Teat dip formulado como producto post ordeño).

Descarte las jeringas ya usadas en los recipientes comunes de residuos domiciliarios.

## **CONTRAINDICACIONES:**

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a penicilinas o Aminoglucósidos.

Los casos de hipersensibilidad a estos antibióticos son raros pero de presentarse alguno deberá tratarse con epinefrina, antihistamínicos y/o corticoides, según corresponda.

## **PRECAUCIONES:**

Administrar el producto hasta no más de 30 días antes de la fecha prevista de parición.

En caso que el parto se adelantara y no se cumplieran 30 días entre la aplicación del producto y la parición, deberá testearse la leche al 5to día post parto por métodos adecuados para comprobar la ausencia de residuos indebidos de penicilina y/o neomicina.

## **PERIODO DE RETIRO:**

Carne: 60 días

## **ALMACENAMIENTO:**

Mantener entre 15 y 25° C.

## **PRESENTACION:**

Caja x 48 unidades.

## **FABRICADO POR:**

Dairyfarma S.R.L.