

## **NOMBRE COMERCIAL:**

TYLOCARE

## **COMPOSICIÓN**

200 mg de tilosina base (como tartrato)

## **INDICACIONES:**

Antibiótico para infecciones causadas por microorganismos susceptibles a la tilosina, como del tracto respiratorio en bovinos, ovejas, cerdos y aves de corral; disentería y artritis causada por mico plasmas, mastitis y endometritis.

## **DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:**

Administración intramuscular Y subcutáneo.

La dosis general es de 1 ml por cada 20 kg de peso vivo por 24 horas, de 3 a 5 días.

## **CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a la tilosina, hipersensibilidad cruzada a los macrólidos.

## **PRECAUCIONES:**

A veces, puede producirse irritación local en el lugar de la inyección (inyecte lentamente).

## **PERIODO DE RETIRO:**

Carne: 21 días.

Leche: 4 días.

## **ALMACENAMIENTO:**

Guardar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz solar.

# Tylocare

**TILOSINA BASE  
SOLUCION INYECTABLE**



**PHARMAVET**  
DEL PERÚ S.A.C.

**PRESENTACIÓN:**

Frascos x 100 ml.

**FABRICADO POR:**

Pantex Holland.