

NOMBRE COMERCIAL:

ANTIINFLAMATORIO DAIRYFARMA

COMPOSICIÓN:

Flunixin (como Meglumina)*	50 mg
Vehiculos c.s.p.	1,00 ml

*Equivalente a 82,95 mg de Flunixin meglumina/ ml

INDICACIONES:

En Bovinos: Desinflama las infecciones por virus y bacterias al sistema respiratorio (neumonía, bronconeumonía), alivia dolores gastrointestinales (diarreas, enteritis, salmonelosis, gastroenteritis, cólicos), y dolores muscoesqueleticos (cojeras, artritis, paresias, etc).

En Porcinos: Alivia problemas de cojera, inflamaciones agudas del sistema locomotor, síndrome de metritis agalaxia, síndrome febril, etc.

En Equinos: Alivia la inflamación y el dolor en el aparato locomotor. Osteitis, artritis, miositis, tendinitis y sinovitis.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

En equinos: Inyección intramuscular o endovenosa lenta/ 1ml x 45 kilos cada 24 horas en caso de dolencias musculoesqueleticos. En casos de cólicos repetir la dosis y que no exceda a 1 vez cada 24 horas. Duración estimada del tratamiento son 5 días o a criterio del médico.

En porcinos: Inyección intramuscular/ 1-2 ml x 45 kilos. Dividir la dosis y administrar cada 12 horas. Duración estimada del tratamiento son 3 días.

En bovinos: Administración de manera endovenosa o intramuscular/ 1-2 x 45 kilos. La dosis se puede dividir a la mitad y aplicarse 2 veces al día en intervalos de 12 horas o administrar 1 dosis al día.



CONTRAINDICACIONES:

No administrar a yeguas gestantes ni a animales menor a 3 días de edad.

PRECAUCIONES:

Inyectar con asepsia. No exceder con la dosis ni con lo indicado anteriormente en los tratamientos.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

ALMACENAMIENTO:

Mantener entre 15° y 25° C.

PRESENTACIÓN:

Frascos x 50 ml.

FABRICADO POR:

Dairyfarma S.R.L.