

NOMBRE COMERCIAL:

EDO FLUNIX

COMPOSICIÓN:

Flunixin meglumina	50 ml
Excipientes c.s.p,	1 ml

INDICACIONES:

Aplicable en equinos, bovinos y porcinos:

En equinos para aliviar el dolor y la inflamación asociados con desórdenes músculoesqueléticos y el dolor visceral asociado a cólicos.

En bovinos para el control de la inflamación aguda asociada con enfermedad respiratoria y coadyuvante en el tratamiento de mastitis aguda.

En porcinos como coadyuvante en el tratamiento de enfermedad respiratoria aguda.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

En equinos: Vía inyección intramuscular o intravenosa/ 2,2 mL por cada 100 Kg de peso.

En bovinos: Vía inyección intramuscular o intravenosa/ 4,4 mL por cada 100 Kg de peso.

En porcinos: Vía inyección intramuscular profunda/ 2,2 mL por cada 50 Kg de peso.

CONTRAINDICACIONES:

Consulte al médico veterinario. Se recomienda utilizar equipos inyectables estériles. Se recomienda utilizar agujas nuevas y mantener condiciones de asepsia.

PRECAUCIONES:

No se requieren precauciones especiales para transportar el producto.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en su propio envase, a temperatura ambiente y protegido de la luz solar y dentro de los límites de temperatura (15° C y 30° C).

PRESENTACIÓN:

Frasco x 10 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml.

FABRICADO POR:

Laboratorios EDO S.A.S.