

# Fipromectin Pour-On

FIPROMECTIN + ALBAMECTINA  
SOLUCIÓN DE USO TÓPICO



PHARMAVET  
DEL PERÚ S.A.C.

## NOMBRE COMERCIAL:

FIPROMECTIN POUR-ON

## COMPOSICIÓN:

Fipronil	10.0 mg
Albamectina	5.0 mg
Excipientes c.s.p	1 mL

## INDICACIONES:

Está indicado para el tratamiento y control de parásitos externos e internos, su acción va dirigido contra **Garrapatas:** *Boophilus microplus* (garrapata común del bovino); **Moscas:** *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos), *Melophagus ovinus* (falsa garrapata). **Larvas de moscas:** *Dermatobia hominis* (tupe, nuca, gusano del cuerno), *Cochliomyia hominivorax* (gusanera o miasis cutánea), *Hypoderma spp.*; **Piojos chupadores:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurytenuis*, *Solenopotes capillatus*. **Piojos masticadores:** *Damalinea bovis*. **Ácaro de la sarna:** *Sarcoptes scabiei var. bovis*, *Chorioptes bovis*. **Nemátodos gastrointestinales:** *Ostertagia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Strongyloides papillosus*, *Trichuris spp.* **Nemátodos pulmonares:** *Dictyocaulus spp.*

## DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Es una solución de uso tópico para aplicación pour-on.

Colocar sobre el dorso(lomo) del animal desde la nuca hasta la base de la cola.

1 mL por cada 10 kg de peso vivo del animal. Se recomienda repetir el tratamiento cada 40 días o según el criterio del médico veterinario. El tratamiento puede variar dependiendo de la severidad de la infestación, las características ambientales o las condiciones de manejo.

# Fipromectin Pour-On

FIPROMECTIN + ALBAMECTINA  
SOLUCIÓN DE USO TOPICO



PHARMAVET  
DEL PERÚ S.A.C.

## CONTRAINDICACIONES:

- No aplicar en áreas de la línea dorsal cubiertas con lodo o estiércol.
- No exponer los animales a precipitaciones dentro de las 2 horas después de la aplicación.
- No usar en vacas lecheras en lactación, ni en vacas gestantes 3 meses antes del parto.

## PRECAUCIONES:

- No aplicar por otra vía, uso estrictamente externo.
- No coma, ni beba durante la manipulación y/o aplicación del producto. Se recomienda el uso de guantes durante su aplicación.
- En caso de contacto con la piel y mucosas del cuerpo humano, lavar el área afectada con abundante agua y jabón.
- Manténgase alejado de los alimentos.
- No permita que el animal lama la piel vertiendo pesticida.
- No bañe ni lave al animal durante al menos 2 días después del tratamiento.
- Mantenga los animales vertidos lejos de la fuente de calor hasta que el animal se seque.
- No vierta directamente sobre el área de piel dañada.
- No aplicar a cachorros y gatitos menores de ocho semanas.
- No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto.

## PERIODO DE RETIRO:

Carne: 100 días.

## ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en un ambiente fresco y seco, entre 15° c y 30° c.

## PRESENTACIÓN:

Frasco x 30 ml, 250 ml y 1 lt.

# Fipromectin Pour-On

**FIPROMECTIN + ALBAMECTINA  
SOLUCIÓN DE USO TOPICO**



**PHARMAVET**  
DEL PERÚ S.A.C.

## **FABRICADO POR:**

HNC Pharmaceutical Co. Ltd. para Pharmavet del Perú SAC