

STREPTOPLUSPEN FORTE 25/20

**PENICILINA + DIHIDROESTREPTOMICINA
SUSPENSION INYECTABLE**



PHARMAVET
DEL PERU S.A.C.

NOMBRE COMERCIAL:

STREPTOPLUSPEN FORTE 25/20

COMPOSICIÓN:

Penicilina G procaínica	200.000 I.U.
Dihidroestreptomicina (Como sulfato)	250 mg
Excipientes	1 ml

INDICACIONES:

Las infecciones causadas por microorganismos sensibles a la penicilina o a la dihidroestreptomicina, como las infecciones respiratorias, uterinas y del tracto alimentario, la metritis, la mastitis, la osteomielitis, la peritonitis, la septicemia, la cistitis, las articulaciones y las infecciones bacterianas secundarias en caballos, vacunos, porcinos, potros, terneros, ovejas y cabras.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Administración intramuscular (no más de 5 ml por punto de inyección).
La dosis general es: 1 ml por cada 25 kg de peso vivo al día, durante 3-4 días.

CONTRAINDICACIONES:

La administración prolongada de dosis altas puede provocar disfunciones renales, vestibulares y / o auditivas y, a veces, pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad.

PRECAUCIONES:

Agite bien antes de usar.

Puede ocasionar hipersensibilidad a penicilinas, aminoglicósidos y / o procaína.

Puede provocar disfunciones renales, alteraciones del sistema auditivo u

STREPTOPLUSPEN FORTE 25/20

**PENICILINA + DIHIDROESTREPTOMICINA
SUSPENSION INYECTABLE**



PHARMAVET
DEL PERÚ S.A.C.

órgano vestibular.

Evitar uso en pequeños herbívoros como conejos, chinchillas y cobayas.

Evitar el uso prolongado en animales gestantes debido al riesgo de ototoxicidad para el feto.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 9 días.

Leche: 4 días.

ALMACENAMIENTO:

Guardar entre 8 – 15 °C, protegido de la luz solar.

PRESENTACIÓN:

Frascos x 100 ml.

FABRICADO POR:

Pantex Holland.