

ANYHILER 1%

Solución inyectable

Antiparasitario interno y externo

Endectocida – Fasciolicida

Altamente efectivo contra garrapatas y parásitos gastrointestinales

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL contiene:

Ivermectina..... 10 mg

Excipientes c.s.p.....100.0 mL

INDICACIONES:

ANYHILER 1% inyectable es un endectocida de amplio espectro interno y externo a base de una solución de Ivermectina al 1 %. Su espectro de acción incluye especies nocivas de nemátodos gastrointestinales, parásito pulmonar, nuche, piojos, ácaros de la sarna y garrapatas:

Nemátodos gastrointestinales: Bunostomum sp., Cooperia sp., Nematodirus sp., Dictyocaulus sp., Graphinema aucheniae., Haemonchus sp., Lamanema chavezy., Nematodirus sp., Oesophagostomum sp., Ostertagia sp, Onchocerca sp., Strongyloides sp., Trichostrongylus sp., Trichuris sp., Toxocara vitulorum.

Parásitos Pulmonares: Dictyocaulus sp. (maduros e inmaduros y larvas inhibidas o hipobióticas).

Larvas nasales y de moscas: Oestrus ovis (todos los estadios), Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum, Dermatobia hominis (nuche o tupe), Cochliomyia hominivorax.

Piojos: Haematopinus euryternus, Linognathus vituli, Solenoptes capillatus, Damalinia bovis.

Ácaros: Chorioptes sp., Psorergates sp., Psoroptes sp., Sarcoptes scabiei var bovis, Sarcoptes scabiei var aucheniae.

Garrapatas: Boophilus microplus.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y camélidos sudamericanos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Para uso en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos por vía subcutánea. Para uso en equinos por vía intramuscular profunda.

Bovinos, equinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos: 1 mL/50 kg p.v.

Porcinos: 1,0 mL /33 kg p.v.

PERIODO DE RETIRO:

Bovinos, caprinos, equinos, camélidos sudamericanos: 35 días

Ovinos: 28 días

Cerdos: 18 días.

CONTRAINDICACIONES:

- No administrar en animales productores de leche, ni durante los 28 días anteriores al parto.
- Las ivermectinas pueden no ser bien toleradas por todas las especies no objetivo (se han notificado casos de intolerancia con resultado fatal en perros - especialmente Collies, Old English Sheepdogs y razas o cruces relacionados, y también en tortugas).
- No utilizar en perros y gatos, ya que pueden producirse reacciones adversas graves.
- No utilizar en casos de hipersensibilidad conocida al principio activo

PRECAUCIONES:

- No administrar por vía intramuscular o intravenosa.
- No administrar a animales en mal estado general, ni en situaciones de estrés intenso.
- El producto es eficaz en todos los estadios de la hipodermosis, sin embargo, es muy importante tratar a tiempo (al final de la temporada de la mosca de la urticaria). La eliminación de las larvas de *Hypoderma* puede provocar reacciones negativas en el hospedador, cuando se encuentran en zonas vitales. La eliminación de *Hypoderma lineatum*, si se encuentra en el tejido perioesofágico, puede causar salivación y timpanismo. El *Hypoderma bovis*, si se encuentra en el canal vertebral, puede causar inestabilidad o parálisis. Los bovinos deben ser tratados antes o después de esas fases de las moscas de la guerra.
- El uso frecuente y repetido de la ivermectina puede desarrollar resistencias.
- No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
- Como la ivermectina es extremadamente peligrosa para los peces y la vida acuática, los animales tratados no deben tener acceso directo a las aguas superficiales y a las acequias durante el tratamiento.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto.
- Debe evitarse el contacto directo con la piel.
- Si se derrama el producto, evitar su contacto con los ojos, heridas o piel inflamada.
- Se aconseja lavar con abundante agua.
- No fumar ni comer mientras se manipula el producto.
- Lávese las manos después de su uso.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, entre 15-30°C, protegido de la luz solar.

PRESENTACIONES:

Frasco x 50, 100, 250 y 500 mL

USO VETERINARIO