

FLUNIXDYNE**Solución inyectable****ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO, ANTIINFLAMATORIO****COMPOSICION:**

Cada 1 mL contiene:

Flunixin Meglumina..... 50 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

DESCRIPCIÓN:

FLUNIXDYNE solución inyectable que contiene en su formulación Flunixin meglumina, fármaco antiinflamatorio no esteroideo con actividad analgésica, antipirética, antiinflamatorio, para el tratamiento de la inflamación y el dolor asociado a diversos padecimientos. No altera la motilidad gastrointestinal y puede coadyuvar en el mejoramiento de la hemodinamia en animales con choque séptico.

INDICACIONES:

Bovinos y rumiantes menores: inflamación aguda asociada a enfermedades del tracto respiratorio, mastitis aguda, paresias posparto, síndrome de la vaca deprimida, babesiosis y anaplasmosis. Antiendotóxico en neumonías, diarreas, cólicos y mastitis. Caballos: Tratamiento de elección en los cólicos del caballo (antiinflamatorio intestinal y antiendotóxico). Tratamiento de la inflamación aguda en casos de alteraciones musculoesqueléticas. Coadyuvante en enfermedades respiratorias agudas. Cerdos: tratamiento asociado al síndrome MMA (mastitis-metritis-agalactia), fiebre e inflamación del aparato locomotor. Perros y gatos: tratamiento de la inflamación y el dolor asociados a enfermedades del aparato respiratorio y locomotor, y situaciones de dolor agudo. En todas las especies: alivio del dolor postoperatorio y postraumático. En general, siempre que esté contraindicado el uso de corticoides.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, camélidos, porcinos y caninos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION:

Vía intravenosa o intramuscular

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos y cerdos: 1 - 2 mL por cada 45 kg de p.v (equivalente a 1.1 – 2.2 mg de Flunixin por cada Kg de p.v.), cada 24 horas durante 3 - 5 días.

Equinos: 1 mL/45 kg de p.v. cada 24 horas por 2 días, pudiendo repetirse el procedimiento en casos de cólico después de 2 horas o cuando reaparezcan los síntomas. De preferencia por vía endovenosa.

Caninos: 0,1 mL por cada 5 kg de p.v. (equivalente a 1.1 mg de Flunixin por cada Kg. p.v.), cada 24 horas durante 3-5 días.

·Se recomienda aplicar por vía intramuscular la dosis en dos sitios de inyección en cada lado del cuello.

CONTRAINDICACIONES:

- No exceder la dosis indicada o la duración del tratamiento

PERIODO DE RETIRO:

- Bovinos: 4 días.
- Cerdos: 12 días.
- Equinos: No administrar a equinos destinados al consumo humano.
- Leche: 36 horas.

PRECAUCIONES:

- Evitar la inyección intraarterial.
- El uso en cualquier animal de menos de 6 semanas de edad o en animales de edad avanzada puede implicar un riesgo adicional. Si no se puede evitar su uso, los animales pueden necesitar una dosis reducida y un manejo clínico cuidadoso.
- No utilizar en lechones que pesen menos de 6 kg.
- Se sugiere que la flunixin se utilice con precaución en animales con úlceras gastrointestinales, enfermedades renales, hepáticas o hematológicas preexistentes.
- Evitar su uso en cualquier animal deshidratado, hipovolémico o hipotenso, excepto en caso de endotoxemia o shock séptico.
- Debido al excipiente propilenglicol, en raras ocasiones pueden producirse reacciones de shock potencialmente mortales. Por tanto, la solución inyectable debe inyectarse lentamente y a una temperatura corporal aproximada.
- Se sabe que los AINEs tienen el potencial de retrasar el parto a través de un efecto tocolítico al inhibir las prostaglandinas que son importantes en la señalización del inicio del parto. El uso del producto en el periodo posparto inmediato puede interferir con la involución uterina y la expulsión de las membranas fetales, lo que da lugar a la retención de la placenta.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administra el medicamento veterinario a los animales :

- El medicamento veterinario puede causar irritación de la piel y de los ojos. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de exposición accidental de la piel, lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. Si la irritación de la piel y/o de los ojos persiste, acuda inmediatamente al médico y muéstrole el prospecto o la etiqueta.
- El medicamento veterinario puede provocar reacciones de hipersensibilidad (alergia). Las personas con hipersensibilidad conocida a los antiinflamatorios no esteroideos deben evitar el contacto con el medicamento veterinario. Las reacciones adversas pueden ser graves. Deben usarse guantes durante la aplicación.
- En caso de autoinyección accidental, acudir inmediatamente al médico y mostrarle el prospecto o la etiqueta. Lavarse las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, entre 15-30°C, protegido de la luz solar.

PRESENTACIONES

Frasco x 20, 50, 100, 250 y 500 ml

USO VETERINARIO