



PHARCORTI 0,2%

Dexametasona al 0,2%

Solución inyectable

COMPOSICIÓN:

Cada mL contiene:

Dexametasona base 2 mg.

Excipientes c.s.p 1 mL.

INDICACIONES:

PHARCORTI 0.2% está indicado para procesos inflamatorios de diversas etiologías parentales que dé una duración media de actividad. Puede utilizarse como agente antiinflamatorio y antialérgico en bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, perros y gatos y para el tratamiento de la cetosis primaria en bovinos. El producto también se puede utilizar para inducir el parto en ganado. La dexametasona es adecuada para el tratamiento de alergias, artritis, bursitis, shock y tendovaginitis.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, terneros, caprinos, ovinos, porcinos, perros y gatos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Para administración intramuscular o subcutánea:

Especies	Dosis(mL)
Bovinos Equinos	5-15 mL
Terneros, ovejas, cabras, potrillos y cerdos	1 - 2.5 mL
Perros	0.25 - 1 mL
Gatos	0.25 mL

CONTRAINDICACIONES:

A menos que se requiera un aborto o un parto temprano, la administración de PHARCORTI al 0.2% durante el último trimestre de gestación está contraindicada.

No se administra a animales con insuficiencia renal o cardíaca.

No se administra a animales con osteoporosis.

PRECAUCIONES:

Dosis superiores a las recomendadas en caballos pueden producir somnolencia o letargo transitorio en algunos caballos. El letargo suele remitir en 24 horas.

No aplicar en terneros que pesen menos de 100 kg.

Agite bien antes de usar.

En el momento del tratamiento, tenga cuidado de evitar horas de calor, frío o lluvia intensos.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

TIEMPOS DE RETIRO:

- Para carne: 3 días.
- Para leche: 1 día.

PRESENTACIONES:

Frasco x 50, 100, 250 y 500 mL.

Almacenar en un ambiente fresco y seco entre 15-30°C, lejos de la luz solar.

USO VETERINARIO

