

CatoPharm - B9 + B12

ESTIMULANTE DEL METABOLISMO CON VITAMINAS ESPECÍFICAS DEL COMPLEJO B.

COMPOSICIÓN:

Cada mL contiene:

Butafosfan	100 mg
Vitamina B12	0.05 mg
Vitamina B9	15 mg
Excipientes c.s.p.	1.0 mL

INDICACIONES:

CATOPHARM B9 + B12 es una solución inyectable que proporciona una combinación balanceada de butafosfán (fósforo orgánico de alta disponibilidad), vitamina B9 (ácido fólico) y vitamina B12 (cianocobalamina) en una sola inyección, influyen sobre casi todos los procesos de asimilación del organismo, e intervienen en un gran número de reacciones enzimáticas. Fomenta el metabolismo carbohidratos, lípidos y aminoácidos, purinas y pirimidinas, favoreciendo la síntesis de ADN de tal forma que influye favorablemente en el crecimiento corporal, en la formación de glóbulos rojos, y demuestra también una acción protectora del hígado. Su fórmula combinada con vitaminas, fomenta el metabolismo de carbohidratos, lípidos, aminoácidos, purinas y pirimidinas, favoreciendo la síntesis de ADN de tal forma que influye favorablemente en el crecimiento corporal, en la formación de glóbulos rojos; demostrando también una acción protectora del hígado. La fórmula de los tres productos en una sola inyección está recomendada para ser utilizado siempre que se requiera una suplementación de fósforo para mejorar la condición de los animales y optimizar la producción. Coadyuvante en el tratamiento y prevención de enfermedades y trastornos metabólicos (agudos y crónicos), anemia, trastornos reproductivos, estrés por alta producción, etc. Mejora el rendimiento muscular y reproductivo, y el estado general. Estimula la preparación de los animales de exposición.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, equinos, porcinos, camélidos, ovinos, caprinos, caninos, felinos y aves

ADMINISTRACIÓN:

Para administración intravenosa, intramuscular o subcutánea:

Bovinos y equinos: 10 – 25 ml.

Aves: 0.5 – 1 ml.

Terneros y potros: 5 - 12 ml.

Cabras, camélidos y ovejas: 2,5 - 5 ml.

Porcinos: 2,5 - 10 ml.

Lechones: 1 – 2.5 mL

Caninos: 0.5 - 5 mL

Felinos: 0.5 – 1 ml.

Vacas lecheras antes del parto: 20 ml a la 6ta y 4ta semana antes del parto.

- Volúmenes mayores a 20 mL, deben ser repartidos en dos puntos de aplicación de usarse la vía intramuscular o subcutánea.
- Repetir diariamente si es necesario.
- En casos de enfermedad crónica: la mitad de la dosis a intervalos de 1 - 2 semanas o menos.
- En animales sanos: la mitad de la dosis).

PERIODO DE RETIRO:

Carne: Ninguno. Leche: Ninguno

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

El cloranfenicol disminuye la respuesta hematopoyética de la vitamina B12. La vitamina C puede inactivar a la vitamina B12. Los bloqueadores H2, el omeprazol, la colchicina, la neomicina, preparaciones de potasio de liberación prolongada, el ácido aminosalicílico y sus sales pueden disminuir la absorción de la vitamina B12.

Antagonista del ácido fólico: metotrexato, pirimetamina, triamtereno. Compuestos dediamicina, trimetoprim, anticonvulsivantes (con posible aumento de convulsiones), la cortisona y el cloranfenicol.

REACCIONES ADVERSAS:

La inyección intramuscular puede producir dolor y/o una reacción local (hinchazón) en el lugar de la inyección. Son pasajeras y remiten sin tratamiento especial.

Se puede manifestar con muy poca frecuencia reacciones de hipersensibilidad o alergia y en algunos animales shock anafiláctico. Si aparecieran, interrumpir el tratamiento.

La administración intravenosa debe ser lenta y controlada pues puede presentarse shock. De ser al caso, suspender la medicación y se tomar las medidas apropiadas.

PRECAUCIONES:

Evite la administración inyectable de animales en climas lluviosos o condiciones polvorientas hasta lo posible.

La administración intramuscular en animales de producción debería ser realizada en la tabla del cuello. Las inyecciones subcutáneas deberían realizarse bajo la piel, en la parte alta del cuello por detrás de la oreja.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el envase en un lugar fresco, entre 15oC y 30oC. y seco y protegido de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACION:

Frasco x 500 mL.

USO VETERINARIO

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

VENTA BAJO RECETA MEDICA