

FIPROMECTIN POUR-ON**Fipronil + Abamectina****Cada 1 ml contiene:**

Fipronil 10.0 mg

Abamectina 5.0 mg

Excipientes c.s.p. 1 mL

INDICACIONES:

Está indicado para el tratamiento y control de parásitos externos e internos, su acción va dirigido contra Garrapatas: *Boophilus microplus* (garrapata común del bovino); Moscas: *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos), *Melophagus ovinus* (falsa garrapata). Larvas de moscas: *Dermatobia hominis* (tupe, nuche, gusano del cuerno), *Cochliomyia hominivorax* (gusanera o miasis cutánea), *Hypoderma* spp.; Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopis eurytetrus*, *Solenopotes capillatus*. Piojos masticadores: *Damalinea bovis*. Ácaro de la sarna: *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*. Nemátodos gastrointestinales: *Ostertagia* spp., *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides papillosus*, *Trichuris* spp. Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus* spp.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Es una solución de uso tópico para aplicación pour on.

Colocar sobre el dorso(lomo) del animal desde la nuca hasta la base de la cola.

1 mL por cada 10 kg de peso vivo del animal. Se recomienda repetir el tratamiento cada 40 días o según el criterio del médico veterinario. El tratamiento puede variar dependiendo de la severidad de la infestación, las características ambientales o las condiciones de manejo.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, caprinos y ovinos.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en áreas de la línea dorsal cubiertas con lodo o estiércol.

No exponer los animales a precipitaciones dentro de las 2 horas después de la aplicación.

No usar en vacas lecheras en lactación, ni en vacas gestantes 3 meses antes del parto.

PRECAUCIONES:

No aplicar por otra vía, uso estrictamente externo.

No coma, ni beba durante la manipulación y/o aplicación del producto.

Se recomienda el uso de guantes durante su aplicación.

En caso de contacto con la piel y mucosas del cuerpo humano, lavar el área afectada con abundante agua y jabón.

Manténgase alejado de los alimentos.

No permita que el animal lama la piel vertiendo pesticida.

No bañe ni lave al animal durante al menos 2 días después del tratamiento.

Mantenga los animales vertidos lejos de la fuente de calor hasta que el animal se seque.

No vierta directamente sobre el área de piel dañada.

No aplicar a cachorros y gatitos menores de ocho semanas.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 100 días

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

CONSERVAR EL PRODUCTO EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO, ENTRE 15° C Y 30° C.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

En caso de emergencia: Centro Toxicológico y

Apoyo a la Gestión Ambiental. Línea Gratuita:

0800-1-3040.

Fabricado Por: HNC Pharmaceutical Co. Ltd China Para: PHARMAVET DEL PERU S.A.C.

R.U.C. 20505264453

Reg. SENASA N°: F.87.53.I.0497

USO VETERINARIO