

ANYHILER C%

Solución inyectable

Antiparasitario interno y externo

Endectocida – Fasciolicida

Altamente efectivo contra garrapatas y parásitos gastrointestinales

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL contiene:

Ivermectina..... 10.0 mg

Clorsulón..... 100.0 mg

Excipientes c.s.p.....100.0 mL

INDICACIONES:

Para el tratamiento de lombrices intestinales (adultos y larvas de cuarto estadio), gusanos pulmonares (adultos y larvas de cuarto estadio), trematodo hepático (Fasciola hepática y F. gigantica; estadios adultos), gusanos oculares, gorjeos (estadios parasitarios), piojos chupadores y sarna ácaros (sarna) en ganado de carne y ganado lechero no lactante.

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, camélidos, caprinos y ovinos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vía subcutánea.

Administrar 1 mL/50 Kg de p.v.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 35 días.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales productores de leche, ni durante los 28 días anteriores al parto.



PRECAUCIONES:

- No administrar por vía endovenosa o intramuscular.
- No administrar a animales en mal estado general, ni en situaciones de estrés intenso.
- No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
- No administrar a animales lactantes.
- No permita que el agua de los corrales de engorde ingrese a lagos, arroyos o estanques.
- No contamine el agua por aplicación directa o la eliminación inadecuada de envases de medicamentos.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Puede aparecer una ligera tumefacción en el sitio de inoculación, lo cual desaparece los pocos días. Divida las dosis superiores a 10 ml entre dos lugares de inyección para reducir las molestias ocasionales o las reacciones en el lugar.
- Este producto ha sido desarrollado específicamente para su uso exclusivo en ganado.
- Este producto no debe utilizarse en otras especies animales, ya que pueden producirse reacciones adversas graves, incluidas muertes en perros.
- Deseche los contenedores en un relleno sanitario aprobado o por incineración.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, entre 15-30°C, protegido de la luz solar.

PRESENTACIONES:

Frasco x 50, 100, 250 y 500 mL

USO VETERINARIO

USO VETERINARIO

