

Pharmfur 5%

COMPOSICIÓN:

Cada 1 ml contiene:

Ceftiofur HCl.....50 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

DESCRIPCIÓN:

Ceftiofur es un antibiótico bactericida que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Semisintético, de tercera generación y de amplio espectro, que se administra al ganado bovino, porcino, equino, ovino, caprino, camélido, canino, para el control de las infecciones bacterianas del tracto respiratorio, con acción adicional contra la podredumbre de las patas y la metritis aguda en el ganado. Tiene un amplio espectro de actividad contra las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. Ejerce su acción antibacteriana mediante la inhibición de la síntesis de la pared celular. El ceftiofur se excreta principalmente en la orina y las heces.

INDICACIONES:**Bovino:**

Pharmfur 5% está indicado para el tratamiento de las siguientes enfermedades bacterianas: Enfermedad respiratoria bovina (BRD, fiebre de embarque, neumonía bacterial) asociada a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni (Haemophilus somnus); Necrobacilosis interdigital bovina aguda (podredumbre del pie, pododermatitis) asociada a Fusobacterium necrophorum y Bacteroides melaninogenicus; metritis aguda (0 a 10 días postparto) asociada a organismos bacterianos como E. coli, Arcanobacterium pyogenes y Fusobacterium necrophorum.

Porcino:

Tratamiento y control de la enfermedad respiratoria bacteriana porcina (neumonía bacteriana porcina) asociada a Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella choleraesuis y Streptococcus suis tipo 2.

Equino:

Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por Streptococcus zooepidemicus.

Ovinos:aprinos y camélidos:

Tratamiento de infecciones respiratorias (neumonía) causadas por Mannheimia(Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis.

Perro:

Tratamiento de infecciones del tracto urinario causados por Escherichia coli, Proteus mirabilis.

ESPECIES DE DESTINO :

Bovino, ovino, equino, caprino, camélido, porcino, canino,

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Vía intramuscular profunda o subcutánea, según la especie de destino.

Bovino:

Infecciones respiratorias bacterianas: 1 mL por cada 50 kg de p.v. durante 3-5 días, por vía subcutánea o intramuscular.

Necrobacilosis interdigital aguda: 1 mL por cada 50 kg de p.v. durante 3 días, por vía subcutánea o intramuscular.

Metritis aguda (0-10 días postparto): 1 mL por 50 kg de p.v. durante 5 días, por vía subcutánea o intramuscular.

Porcino:

Infecciones respiratorias bacterianas: 1 mL por cada 10-16 kg de peso corporal durante 3 días, por vía intramuscular.

Equinos:

Administrar intramuscularmente a una dosis de 2.2 a 4.4 mL por cada 50 Kg de peso vivo a intervalos de 24 horas hasta que los signos clínicos hayan desaparecido. No inyectar por mas de 10 días.

Ovinos, caprinos y camélidos:

Administrar intramuscularmente a una dosis de 0.22 a 0.44 mL por cada 10 Kg de peso vivo a intervalos de 24 Horas por 3 días. Para animales que no muestren una respuesta satisfactoria debería repetirse un tratamiento adicional de 4 a 5 días.

Caninos:

Administrar subcutáneamente a una dosis de 0.044 mL por Kg de peso vivo a intervalos de 24 horas durante 5 a 14 días hasta que los signos clínicos hayan desaparecido.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a las cefalosporinas y a otros antibióticos B-lactámicos.

No administrar a animales con una función renal muy deteriorada.

No administrar simultáneamente con productos que contengan tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas.

No administrar por vía endovenosa.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Ocasionalmente pueden producirse reacciones de hipersensibilidad leves en el lugar de la inyección, que remiten sin necesidad de tratamiento adicional.



PRECAUCIONES:

- Agitar bien antes de usar y no administrar más de 15 mL en el ganado vacuno por punto de inyección, no más de 10 mL en el ganado porcino y equino por punto de inyección, no más de 5 mL en ovinos, caprinos, camélidos y caninos.. Las inyecciones sucesivas deben administrarse en sitios diferentes.
- No utilizar la misma jeringa en combinación con otras sustancias.
- No usar por vía endovenosa. No refrigerar.
- Si se produce una reacción alérgica, busque atención médica con epinefrina inyectable y consulte a su médico veterinario.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a la penicilina o cefalosporina deben evitar la exposición a este producto.
- Lavarse cuidadosamente las manos luego de manipular el producto.
- Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- No transportar con alimentos, bebidas o animales domésticos.
-

PERIODO DE RETIRO:

- Carne: 2 días
- Leche: 0 días.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15-30°C. Mantener alejado del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Frascos x 50, 100 y 250 mL.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

Fabricado por: HNC Pharmaceutical Co, Ltd China; para PHARMAVET DEL PERÚ S.A.C RUC: 20505264453