

Pharmfur 5% / Plus K**Ceftiofur 5%****COMPOSICIÓN:**

Cada 1 mL contiene:

Ceftiofur HCl 50 mg

Ketoprofeno 100 mg

Excipientes c.s.p. 1 mL

DESCRIPCIÓN:

PHARMFUR 5% PLUS K en una formulación a base de ceftiofur (como clorhidrato), antibiótico betalactámico cefalosporínico de tercera generación y amplio espectro, activo contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. Además, contiene Ketoprofeno, antiinflamatorio no esteroideo con propiedades antipiréticas y analgésicas.

INDICACIONES:

Pharmfur 5% Plus K, se usa para procesos infecciosos causados por microorganismos sensibles al Ceftiofur y procesos inflamatorios.

Dentro de los procesos infecciosos podemos destacar: laminitis aguda y crónica; mastitis infecciosa aguda, distocia. También puede usarse en el postquirúrgico inmediato (cesáreas y otras cirugías, como el descornado en terneros mayores).

Agentes susceptibles:

- Bovinos, caprinos, ovinos y camélidos: pasteurelosis, neumonía, infección por *Haemophilus somnus*, metritis, mastitis, pederia.
- Cerdos: pasteurelosis, bronquitis, neumonía, pleuroneumonía, salmonelosis, colibacilosis.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Vía inyectable intramuscular y/o subcutánea.

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos:

Administrar subcutáneamente en el cuello 1 mL por 50 kg de peso/día (1 mg/kg de ceftiofur y 2 mg/kg de ketoprofeno). El tratamiento debe ser repetido a intervalos de 24 horas durante 3 a 5 días consecutivos.

Porcino:

Administrar una dosis de 1 mL por 10-16 kg de peso corporal del animal (3-5 mg de ceftiofur y 6-10 mg de ketoprofeno por 1 kg de peso corporal del animal), cada 24 horas, durante 3 días.

CONTRAINDICACIONES:

- No utilizar en animales con hipersensibilidad a las sustancias activas o a cualquier excipiente.
- No mezclar el medicamento con otros fármacos en la misma jeringa.

**PRECAUCIONES:**

- No utilizar en animales con insuficiencia renal aguda.
- No utilizar en animales menores de 6 semanas de edad.
- No utilizar en animales con hematopoyesis alterada, úlceras gastrointestinales, enfermedades renales y hepáticas. No utilizar en animales en estado de hipotensión, hipovolemia y deshidratación.
- No utilizar simultáneamente con otros antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos o anticoagulantes, así como con tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas.

PERIODO DE RETIRO:

- Carne: 4 días
- Leche: 0 días.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar seco y oscuro a una temperatura de 10 - 30 °C.

Evitar la congelación.

Mantener alejado del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Frascos x 50, 100 y 250 mL

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

Fabricado por:

HNC Pharmaceutical Co, Ltd China; para

PHARMAVET DEL PERÚ S.A.C

RUC: 20505264453