

Cortishoot - SP

**Combinación antibiótica sinérgica de amplio espectro
+ Antiinflamatorio corticoide de rápida acción**

COMPOSICION:

Cada 1 mL contiene:

Penicilina G Procaínica.....200 000 UI

Dihidroestreptomicina Sulfato250 mg

Dexametasona 1mg

INDICACIONES

CORTISHOOT – SP, es una combinación antibiótica de amplio espectro más antiinflamatorio, listo para usarse; contiene penicilina G procaínica y dihidroestreptomicina, antibióticos que actúan contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, asociados a un antiinflamatorio corticoide de rápida acción.

CORTISHOOT – SP, está indicado para tratar artritis, mastitis e infecciones gastrointestinales, respiratorias y del tracto urinario causadas por microorganismos sensibles a la penicilina y a la dihidroestreptomicina, siempre que se requiera de un efecto antiinflamatorio, antialérgico y/o gluconeogénico como *Campylobacter* spp, *Clostridium* spp, *Corynebacterium* spp, *E.coli*, *Erysipelothrix* spp, *Haemophilus* spp, *Klebsiella* spp, *Listeria* spp, *Pasteurella* spp, *Salmonella* spp y *Staphylococcus* spp, *Bacillus anthracis*, *Leptospira* spp, entre otros.

Efectivo para el tratamiento de enfermedades infecciosas del tracto respiratorio incluyendo neumonía y rinitis atrófica, síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia), infecciones puerperales, clostridiosis, erisipela, heridas infectadas, tratamiento postoperatorio, listeriosis, leptospirosis, peritonitis, infecciones post-operatorias, meningitis, septicemia, mastitis, infecciones cutáneas, infecciones del tracto urogenital, enteritis y en el control de bacterias secundarias consecutivas a enfermedades de origen viral.

Indicaciones específicas incluyen: Bovinos: carbunclo sintomático y bacteriano, difteria, abscesos, actinomicosis, edema maligno, necrobacilosis, nefritis, infecciones oftálmicas, etc. Equinos: acné contagioso, leptospirosis, dolores articulares, poliartritis, infecciones de las vías respiratorias, botriomicosis. Porcinos: bronconeumonías, síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia), poliartritis, erisipela porcina. Ovinos, caprinos y camélidos: edema maligno (clostridiosis), poliartritis, pielonefritis. Caninos y Felinos: estreptococosis, estafilococosis y clostridiosis, leptospirosis, infecciones bucales (periodontitis y abscesos dentales), heridas infectadas, mordeduras y abscesos.

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos, caninos y felinos.

ADMINISTRACION Y DOSIFICACION:

Para administración intramuscular:

1ml por cada 10kg de peso corporal cada 72 horas.

Cuando la opinión profesional lo recomiende, puede administrarse cada 48 horas.

Dosis máximas por punto de inyección: 20 mL en bovinos, 10 mL en equinos y porcinos, 5 mL en terneros, ovinos y caprinos. Las dosis podrían ser variadas bajo criterio del médico veterinario tratante

PERIODO DE RETIRO

Carne: 21 días. Leche: 3 días.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a animales con hipersensibilidad a la penicilina G procaína y/o aminoglucósidos.
- No administrar de manera simultánea con tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas.
- No administrar por vía intravenosa.
- No administrar a animales con serio daño en la función renal ni hepática, salvo sea previa evaluación del profesional veterinario.
- No utilizar en pacientes contraindicados a corticosteroides como aquello que sufren: diabetes mellitus, osteoporosis, hiper-adrenocorticismo, enfermedad renal y congestión o disfunción cardíaca.
- No administre este medicamento a hembras gestantes. La administración de dexametasona en los primeros meses de la gestación causa deformidades fetales en animales de laboratorio. Es probable que la administración en los últimos meses de gestación provoque un aborto o parto prematuro en rumiantes con retención de placenta, posible metritis y/o baja fertilidad. Puede tener un efecto similar en otras especies.
- No utilizar en otras especies diferentes a las indicadas.
- No utilizar en pacientes con infecciones fúngicas sistémicas ni en pacientes con trombocitopenia idiopática.

REACCIONES ADVERSAS:

- La administración de dosis terapéuticas de penicilina G procaína podría resultar en aborto en cerdas.
- Ototoxicidad, neurotoxicidad o nefrotoxicidad.
- Reacciones hipersensibles.
- Una caída temporal en la producción de leche en animales lactantes.
- Poliuria y polidipsia.
- Curación retardada de heridas.

PRECAUCIONES :

- Poliuria y polidipsia.
- Curación retardada de heridas.
- Agite bien el frasco antes de usarlo. Se reconstituye fácilmente mediante un movimiento circular
- Se debe tener cuidado de no exceder la dosis recomendada.
- No se debe de consumir la leche de los animales durante el tratamiento.
- La leche para consumo humano sólo puede tomarse después de 60 horas desde el último tratamiento. No debe utilizarse en ovejas que producen leche para el consumo humano.
- No debe utilizarse en caballos destinados al consumo humano. El ganado bovino, ovino y porcino sólo puede ser sacrificado para el consumo humano después de 21 días desde el último tratamiento.

- No administrar más de 20 mL en bovinos, más de 10 mL en equinos y porcinos ni más de 5 mL en terneros, ovinos y caprinos por lugar de inyección.
- Puede aparecer una ligera tumefacción en el sitio de inoculación, la cual desaparece a los pocos días.
- La penicilina y la cefalosporina pueden causar sensibilización tras su inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. La sensibilidad a la penicilina puede provocar una sensibilidad cruzada a la cefalosporina y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias son ocasionalmente graves.
- No manipule este producto si sabe que está sensibilizado, o si se le ha aconsejado no trabajar con este tipo de preparados.
- Manipule este producto con mucho cuidado para evitar la exposición tomando todas las precauciones recomendadas.
- Si desarrolla síntomas tras la exposición, como una erupción cutánea, debe acudir al médico y mostrarle esta advertencia. La hinchazón de la cara, los labios o los ojos o la dificultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el envase en un lugar fresco, entre 8 – 15 °C. y seco y protegido de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20, 50, 100 y 250 mL.

USO VETERINARIO

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. VENTA BAJO RECETA MEDICA

Fabricado por:

HNC Pharmaceutical Co, Ltd China; para PHARMAVET DEL PERÚ S.A.C

RUC: 20505264453