



Fosmagcal

SOLUCIÓN INYECTABLE- RECONSTITUYENTE

Calcio compuesto para Bovinos

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL contiene:

Gluconato de calcio15 000 mg
Hipofosfito de magnesio 5000 mg
Cloruro de magnesio 3 000 mg
Cloruro de potasio 26 000 mg
Cloruro de sodio 850 mg
Glucosa 2 000 mg
Clorhidrato de difenhidramina .. 50 mg
Excipientes c.s.p. 100 ml

INDICACIONES:

FOSMAGCAL se utiliza para tratar y prevenir la fiebre puerperal, la paraplejia posparto o la falta de calcio, fósforo, magnesio y azúcar en las vacas. También se utiliza en la intoxicación por cetosis o el tratamiento de la intoxicación.

ESPECIE DE DESTINO:

Bovino, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Vía endovenosa lenta o intramuscular

- Bovino y Equino: 500 mL
- Ovino, caprino, camélidos sudamericanos y porcino: 100 - 250 mL

PERIODO DE RETIRO:

No posee.

CONTRAINDICACIONES:

FOSMAGCAL está contraindicado en animales con fibrilación ventricular o hipercalcemia; así como animales hipersensibles a alguno de los componentes.

INTERACCIONES:

- Animales tratados terapéuticamente con digitálicos, son susceptibles a desarrollar arritmias si reciben calcio endovenoso. El calcio puede antagonizar los efectos del verapamil u otro agente bloqueador de los canales de calcio.
- Los diuréticos tiazídicos usados en conjunto con grandes dosis de calcio pueden causar hipercalcemia, especialmente en animales con falla renal.





- El calcio aplicado parenteralmente puede neutralizar los efectos de la hipermagnesemia o toxicidad ocasionada por magnesio, secundaria a la administración de sulfato de magnesio vía parenteral.

REACCIONES ADVERSAS:

- La hinchazón en el lugar de aplicación hasta una semana después de haber sido administrado el producto.
- El animal puede sufrir de shock durante la administración intravenosa. Si esto ocurriese suspender su uso.

PRECAUCIONES:

- Verificar la asepsia, antes de la aplicación intravenosa.
- No aplicar más de 10 mL por punto de aplicación.
- La aplicación prolongada de calcio en los animales, puede conllevar a su incremento en el plasma y repercutir en el funcionamiento cardíaco, con el riesgo de producir paro cardíaco en sístole.

PRESENTACIONES:

Se comercializa en frascos de 20, 50, 100, 250 y 500 mL.

EN CASO DE EMERGENCIA:

Centro Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental. Línea Gratuita: 0800-1-3040.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

CONSERVAR EL PRODUCTO EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO, ENTRE 15° C Y 30° C.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.