

ANYHILER 3.15%

Solución inyectable

Antiparasitario interno y externo

COMPOSICION:

Cada mL contiene:

Ivermectina..... 31.5 mg

Excipientes c.s.p..... 1.0 mL

INDICACIONES:

ANYHILER 3.15% inyectable es un endectocida de amplio espectro interno y externo a base de una solución de Ivermectina al 3.15 %. Efectivo tanto para parásitos artrópodos y nemátodos. Su espectro de acción incluye:

Parásitos gastrointestinales: *Bunostomum* sp., *Cooperia* sp., *Nematodirus* sp., *Dictyocaulus* sp., *Graphinema aucheniae*., *Haemonchus* sp., *Lamanema chavez*., *Nematodirus* sp., *Oesophagostomum* sp., *Ostertagia* sp, *Onchocerca* sp., *Strongyloides* sp., *Trichostrongylus* sp., *Trichuris* sp., *Toxocara vitulorum*.

Parásitos Pulmonares: *Dictyocaulus* sp. (maduros e inmaduros y larvas inhibidas o hipobióticas).

Larvas nasales y de moscas: *Oestrus ovis* (todos los estadíos), *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, *Dermatobia hominis* (nuche o tupe), *Cochliomyia hominivorax*.

Piojos: *Haematopinus euryternus*, *Linognathus vituli*, *Solenoptes capillatus*, *Damalinia bovis*.

Ácaros: *Chorioptes* sp., *Psorergates* sp., *Psoroptes* sp., *Sarcoptes scabiei* var *bovis*, *Sarcoptes scabiei* var *aucheniae*.

Garrapatas: *Boophilus microplus*.

ESPECIES DE DESTINO:

Terneros, bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, camélidos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Para administración subcutánea. Aplicar a nivel del cuello o por delante de la paleta.

Terneros, Bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, camélidos: 1 mL por cada 50 kg de p.v (630 ug de ivermectina/Kg de p.v)

Intervalos entre dosis:

PARASITOS INTERNOS	DÍAS
<i>Haemonchus</i> spp.	42
<i>Ostertagia ostertagi</i>	49
<i>Trichostrongylus</i> spp	42
<i>Cooperia</i> spp.	42
<i>Oesophagostomum</i> spp.	49
<i>Dictyocaulus viviparus</i>	63
Larvas de tercer estadio	49
PARASITOS EXTERNOS	DÍAS
<i>Boophilus microplus</i> (garrapata común)	75
<i>Dermatobia hominis</i> (nuche)	140
<i>Haematobia irritans</i> (Mosca de los cuernos)	28

Una sola aplicación es suficiente para combatir infestaciones de sarna psoróptica y sarcóptica. En casos aislados puede ser necesario repetir cada 50 días

PERIODO DE RETIRO:

Para carne: 122 días

No administrar en animales productores de leche, ni durante los 28 días anteriores al parto.

CONTRAINDICACIONES:

- No administrar en animales productores de leche, ni durante los 28 días anteriores al parto.
- No utilizar en perros y gatos, ya que pueden producirse reacciones adversas graves.
- No utilizar en casos de hipersensibilidad conocida al principio activo
- No administrar por vía intramuscular o intravenosa.

PRECAUCIONES:

- Los rebaños infectados tratados y no tratados deben evitarse al menos siete días después del tratamiento.
- El producto es eficaz en todos los estadios de la hipodermosis, sin embargo, es muy importante tratar a tiempo (al final de la temporada de la mosca de la urticaria). La eliminación de las larvas de *Hypoderma* puede provocar reacciones negativas en el hospedador, cuando se encuentran en zonas vitales. La eliminación de *Hypoderma lineatum*, si se encuentra en el tejido perioesofágico, puede causar salivación y timpanismo. El *Hypoderma bovis*, si se encuentra en el canal vertebral, puede causar inestabilidad o parálisis. Los bovinos deben ser tratados antes o después de esas fases de las moscas de la guerra.
- En caso de predios en proceso de erradicación de la garrapata *Boophilus microplus*, se deberá aplicar el producto cada 45 días.
- El uso frecuente y repetido de la ivermectina puede desarrollar resistencias.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto.
- Debe evitarse el contacto directo con la piel.
- Si se derrama el producto, evitar su contacto con los ojos, heridas o piel inflamada.
- Se aconseja lavar con abundante agua.
- No fumar ni comer mientras se manipula el producto.
- Lávese las manos después de su uso.
- Este producto no es para uso intravenoso o intramuscular.
- Como la ivermectina es extremadamente peligrosa para los peces y la vida acuática, los animales tratados no deben tener acceso directo a las aguas superficiales y a las acequias durante el tratamiento.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, entre 15-30°C, protegido de la luz solar.

PRESENTACIONES:

Frasco x 50, 100, 250 y 500 mL

USO VETERINARIO