

BHUROX**Cipermetrina + Clorpirifos + Butóxido de piperonilo****COMPOSICIÓN:**

Cada 100 ml contiene:

Cipermetrina.....10,0 g

Clorpirifos.....12,5g

Butoxido de piperonilo.....10,0 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES:

Bhurox es un Garrapaticida y ectoparacitocida con una combinación de 3 principios activos que le provee al producto un efecto sinérgico. Combate la garrapata común del ganado como *Boophilus microplus* y otras especies de garrapatas. Controla insectos que pican como mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*), mosca brava (*Stomoxys calcitrans*), mosquitos y tábanos. También, ácaros, piojos pulgas, entre otros. Tiene una acción residual de hasta 4 semanas.

ESPECTRO DE ACCIÓN :

Incluye:

Acaros y Garrapatas: Controla larvas, adultos y ninfas de las garrapatas e inhibe fuertemente la ovoposición de las hembras adultas. *Boophilus microplus*, *Amblyomma cajennense*, *Haemaphysalis* spp., *Ixodes* spp, *Rhipicephalus sanguineus* (garrapata del perro), *Sarcoptes scabiei*, *Demodex* spp., *Chorioptes* spp., *Notoedres cati*.

Moscas y tábanos: *Musca* spp., *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos).

DOSIFICACIÓN:

Para baño de inmersión:

Tasa de dilución inicial: 1: 1000 L de agua dulce o salobre. Restitución: 1.5: 1000 L de agua, estas operaciones se realizarán cuando el nivel del baño descienda en un 10% de su capacidad. Refuerzo en seco: 0,5: 1000 L de agua disminuida en el bañero, cuando no se realiza ningún recambio de agua.

Para baño de aspersión:

1: 1000 litros de agua Para pulverizadores de mochila de 16, 18 y 20 L, utilizar 16, 18 y 20 ml de producto respectivamente.

Para Pulverización en establos e instalaciones.

1 mL por cada 1 a 2 Litros de agua (proporción de 1 L de la emulsión final cada 10 a 15 m² de superficie a tratar). Para el correcto uso del producto, hacer una emulsión en un volumen de agua equivalente al doble de la cantidad del producto a utilizar.

INSTRUCCIÓN DE USO

Por inmersión:

Preparación del baño: En un recipiente a parte, hacer una preemulsión(premezcla) con la cantidad de Bhurox requerida y el cuádruple de la misma cantidad de agua. Añadir esta premezcla en el contenido del baño a lo largo del mismo. Se recomienda realizar un enjuague del recipiente utilizado para la premezcla y agregar este enjuague al contenido del bañadero. Antes de iniciar, agitar el baño intensamente antes de su uso durante 10 minutos y luego hacer pasar 70 - 100 animales, para homogenizar el contenido del baño. Estos animales deben de pasar nuevamente por el bañadero. Esta premezcla y homogenización de hará en cada refuerzo, recarga o inicio de baño. Llevar el control del pasaje y de los niveles (en especial del nivel del baño al concluir cada pasaje de animales, las reposiciones y los refuerzos)

Durante el baño: El tiempo de pasaje del animal a través del bañadero no deberá ser menor a 15 segundos.

Uso por aspersión:

Aplicar la emulsión final por aspersión usando 1L/100 Kg de peso vivo aprox., lo que equivale a 100 mL de Bhurox diluido en 900 mL de agua.

FRECUENCIA DEL TRATAMIENTO:

Para el control de garrapatas: Bañar cada 21 días

Para traslado de animales de campo infectado a limpio y/o como preventivo: Realizar 2 baños con 9 días de intervalo.

Plan de erradicación: Realizar 2 baños con 9 días de intervalo. Luego cada 21 días hasta erradicación.

Mosca de los cuernos: Se recomienda repetir el tratamiento cada vez que se observen más de 25 moscas en el animal

ONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. No mezclar con otras sustancias ajenas al producto.

EFFECTOS NO DESEADOS:

Ninguno a la dosis recomendada. Puede aparecer ocasionalmente fenómenos de irritación local, incluyendo prurito, urticaria, edema, eczema, erupciones, eritema.

PERIODO DE RETIRO:

Los animales no deben sacrificarse para el consumo humano dentro de los 15 días posteriores al final del tratamiento. No utilice leche para consumo humano o industrialización dentro de las 48 horas posteriores a la dosificación.

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA ADMINISTRACIÓN:

No debe utilizarse en animales que sean alérgicos al clorpirifos + cipermetrina.

Se debe tener cuidado de no exceder la dosis recomendada. Use ropa y guantes protectores cuando use este pesticida.

Evite la inhalación de la niebla del pesticida.

No coma ni beba durante la aplicación.

Lávese las manos y la cara a tiempo después de la aplicación. Se recomienda que los insecticidas con diferentes mecanismos se utilicen alternativamente.



MEDIDAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE :

Altamente tóxico para abejas. Muy tóxico para organismos acuáticos.

No utilizar en lugares cercanos a arroyos, ríos, lagos. No derramar el contenido de los envases y/o lavado de los mismos en corrientes de agua, ríos, lagos, etc.

En caso de derrame, absorber con arena.

No reutilizar los envases vacíos. Romperlo o quemarlo, posteriormente enterrarlos a 1 metro de profundidad.

PRECAUCIONES GENERALES:

Agitar bien antes de usar.

No aplicar en terneros que pesen menos de 100 kg.

No bañar a animales cansados, sedientos, o con fuerte exposición al sol

En el momento del tratamiento, tenga cuidado de evitar horas de calor, frío o lluvia intensos.

Úselo con cuidado. La ingestión, la aspiración y el contacto con la piel son peligrosos.

No presenta incompatibilidad ni toxicidad a las dosis recomendadas.

Durante el uso del producto, el trabajador debe evitar el contacto con la piel y las mucosas.

Lávese las manos y las partes expuestas con agua y jabón, cámbiese de ropa inmediatamente después de su uso.

Lave muy bien la ropa usada durante la aplicación.

En caso de ingestión accidental lea los primeros auxilios y busque atención médica con el envase correspondiente.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:

Se deben evitar los productos inflamables, el contacto con oxidantes fuertes, el calor excesivo, las chispas y las llamas directas.

No lo use ni lo guarde cerca del calor. Llamas o superficies calientes.

Almacenar en un lugar fresco, entre 15-30°C ventilado y protegido de la luz solar.

PHARMAVET DEL PERU S.A.C. R.U.C. 20505264453

USO VETERINARIO

