

MastTop

SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA

Uso Veterinario

FÓRMULA:

Cada 10 g contiene:

Penicilina G Procaina..... 100,000 UI

Estreptomicina sulfato..... 100 mg

Neomicina sulfato.....100 mg

Prednisolona.....10 mg

Excipientes c.s.p.....10 g

INDICACIONES PARA EL USO

La suspensión intramamaria Mast-Stop se utiliza para el tratamiento de la mastitis pre-aguda, aguda y crónica de las vacas lactantes debida a bacterias gram-positivas y gram-negativas como Streptococcus sp., Staphylococcus sp., E. coli, neumonía por Klebsiella.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Administrar un tubo de 10 g en el cuarto infectado a través del pezón.

El tratamiento debe continuar durante 3 días en intervalos de 24 horas.

Agitar antes de usar.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

Hipersensibilidad a la penicilina y/o a la procaína.

No administrar a animales con función renal gravemente dañada.

No administrar simultáneamente con tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas.

PRECAUCIONES:

Agitar la jeringa antes de usar.

No debe utilizarse en animales alérgicos a las penicilinas.

No coma ni beba durante la aplicación.

Lávese las manos antes y después de utilizar el producto.

No utilice la jeringa para administrar otros productos.

PERIODO DE RETIRO

El ganado que se mantiene para la carne no debe ser enviado al matadero durante el tratamiento y durante 7 días después de la última administración de la droga.

La leche de las vacas obtenida durante el tratamiento y dentro de las 72 horas (6 ordeños) siguientes a la última administración de la droga no debe ser ofrecida al consumo humano.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un lugar fresco, entre 15-30°C, ventilado y protegido de la luz solar.

PRESENTACIONES:

Caja x 24 Jeringas x 10 g.

Fabricado por:

HNC Pharmaceutical Co, Ltd China; para

PHARMAVET DEL PERÚ S.A.C

RUC: 20505264453