

Pharmox 20% inj LA

Amoxicilina 20% Larga Acción

COMPOSICIÓN:

Cada 1 mL contiene:

Amoxicilina base 200 mg

Excipientes c.s.p. 1 mL

DESCRIPCIÓN:

La amoxicilina es una penicilina semisintética de amplio espectro con acción bactericida contra bacterias tanto Gram-positivas como Gram-negativas. El rango de efecto incluye *Campylobacter*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *E. coli*, *Erysipelothrix*, *Haemophilus*, *Pasteurella*, *Salmonella*, *Staphylococcus* negativos a la penicilina y *Streptococcus* spp. La acción bactericida se debe a la inhibición de la síntesis de la pared celular.

La amoxicilina se excreta principalmente por la orina. Una parte importante también puede ser excretada en la bilis.

INDICACIONES:

Pharmox 20% Inj L.A., está indicado para infecciones gastrointestinales, respiratorias, sistémicas y del tracto urinario causadas por microorganismos sensibles a la amoxicilina, como *Campylobacter*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *E. coli*, *Erysipelothrix*, *Haemophilus*, *Pasteurella*, *Salmonella*, *Staphylococcus* negativos a la penicilina y *Streptococcus* spp. en terneros, bovinos, caprinos, ovinos y porcinos.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovino, ovino, caprino, porcino, camélido, equino, canino y felino.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y camélidos (I.M y S.C)

1 mL por cada 20 Kg de p.v. cada 24 horas, en caso de infecciones severas o shock sépticos.

1 mL por cada 20 Kg de p.v. cada 48 horas, en caso de infecciones leves o quimioprofilaxis.

Equinos (I.M):

1 mL por cada 10 Kg de p.v. cada 12-24 horas, en caso de infecciones severas o shock sépticos.

1 mL por cada 10 Kg de p.v. cada 48 horas, en caso de infecciones leves o quimioprofilaxis.

Caninos y Felinos (I.M y S.C):

1 mL por cada 20 Kg de p.v. (10 mg/Kg), cada 12 horas, en caso de infecciones severas o shock séptico.

1 mL por cada 10 Kg de p.v. (20 mg/Kg) cada 24 horas, en caso de infecciones severas o shock séptico.

1 mL por cada 10 - 13 Kg de p.v. cada 48 horas: En caso de infecciones leves o quimioprofilaxis.

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a la amoxicilina.

No administrar a animales con una función renal muy deteriorada.

No administrar en simultáneo con productos a base de tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas.

EFFECTOS SECUNDARIOS::

Reacciones de hipersensibilidad.

PRECAUCIONES:

Agítese antes de usar.

No administrar por vía endovenosa.

No administrar más de 20 mL por punto de inyección en bovinos, más de 10 mL por punto de inyección en cerdos y más de 5 mL en terneros, ovejas y cabras por punto de inyección.

Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

PERIODO DE RETIRO:

- Para la carne: 21 días.
- Para la leche: 3 días.

:ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15-30°C.

Mantener alejado del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Frascos x 50, 100 y 250 mL.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

Fabricado por:

HNC Pharmaceutical Co, Ltd China; para

PHARMAVET DEL PERU S.A.C

RUC: 20505264453