



IRONPHARM

Solución inyectable

Suplemento reconstituyente mineral vitaminado

COMPOSICIÓN:

Cada 1 mL contiene:

Hierro (equivalente a hierro dextrano)	200 mg
Vitamina B12	1 mg
Excipientes c.s.p.....	1.0 mL

INDICACIONES

IRONPHARM por su contenido de hierro dextrano se utiliza para la profilaxis y tratamiento de la anemia, pérdida de apetito, diarreas, crecimiento retardado, resistencia disminuida contra gérmenes, como consecuencia causada por la deficiencia de hierro en lechones y otros animales, mientras que la vitamina B12 ayuda a impulsar la producción de glóbulos rojos.

ESPECIES DE DESTINO

Lechones, terneros, bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, equinos, potros.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION

Lechones: 1 mL (I.M) (2 a 4 días después del nacimiento) en el músculo trasero.

Terneros: 1.5 – 3.0 mL (S.C). en un pliegue de piel sobre el cuello, durante la primera semana después del nacimiento.

Bovino y equino: 2.0 – 4.0 mL (I.M)

Potros: 1.5 – 3.0 mL (I.M)

Ovinos, caprinos y camélidos: 1 – 2 mL (I.M)

CONTRAINDICACIONES:

·Contraindicado en animales con carencia de Vitamina E y/o selenio.





REACCIONES ADVERSAS:

- Se puede manifestar con muy poca frecuencia reacciones de hipersensibilidad; si aparecieran, interrumpir el tratamiento.
- La reacción local puede ocurrir en el lugar de la inyección en los animales hasta una semana después de la administración.

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administra el medicamento veterinario a los animales

PRECAUCIONES:

- Las inyecciones intramusculares de hierro pueden provocar una tinción persistente en el músculo del jamón.
- Puede producirse dolor, inflamación y abscesos en el lugar de la inyección. En casos extremos puede presentarse la muerte.
- No existe tiempo de suspensión para carne ni para leche.
- Solo para uso animal.
- No mezclar con otras sustancias en la misma jeringa o envase del producto.
- Deben practicarse las técnicas normales de inyección aséptica.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, entre 15-30°C, protegido de la luz solar.

PRESENTACIONES:

Frasco x 50, 100, 250 y 500 mL.

USO VETERINARIO

