



Pharma-Strep 20/20

COMPOSICIÓN:

Cada 1 ml contiene:

Penicilina G procaínica.....200 000 UI

Dihidroestreptomicina (como sulfato)..... 200 mg

Excipientes c.s.p.....1 ml

ESPECTRO DE ACTIVIDAD:

La penicilina G. procaínica tiene espectro contra bacterias grampositivas principalmente (estreptococos, estafilococos, corinebacterias spp, Erysipelothrix rhusiopathiae, clostridia spp, Bacillus anthracis) y cocos gramnegativos (Leptospira canis, fetus canis, Campylobacter y Actinomyces bovis). La dihidroestreptomicina es un antibiótico amino glucósido, tiene actividad bactericida contra bacterias principalmente gramnegativas como E.coli, Proteus vulgaris, Brucella spp, Salmonella spp, Shigella spp, Klebsiella spp, Pasteurella spp y micoplasmas. Esta combinación actúa de forma aditiva y sinérgica.

INDICACIONES:

Infecciones causadas por microorganismos susceptibles a la penicilina o dihidroestreptomicina, como infecciones del tracto respiratorio, uterino y alimentario, metritis, mastitis, osteomielitis, peritonitis, septicemia, cistitis, artritis.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos, camélidos.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Para administración vía intramuscular (se recomienda no más de 5 ml por punto de inyección). La dosis general es 1 ml/20 Kg de p.v, por 3 días.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la penicilina y/o amino glucósidos.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

La administración prolongada en dosis altas puede provocar disfunciones renales, vestibulares y/o auditivas, a veces reacciones de hipersensibilidad.

PRECAUCIONES:

No debe usarse para animales con alergia a las penicilinas. Agitar bien antes de usar. Mantener alejado del alcance de los niños.

PERIODO DE RETIRO:

Para carne: 30 días / Para leche: 7 días.

ALMACENAJE:

Almacenar en un lugar fresco y seco entre 2 -15 ° C, protegido de la luz.

PRESENTACIÓN:

Frasco de vidrio de 100 ml.

Venta bajo receta médica.